

Verkjustilling í líknandi meðferð

Skilgreining á verk:

"Er óþægileg skynjun eða tilfinning vegna raunverulegra eða hugsanlegra vefjaskemmda eða honum er lýst sem slíkri skemmd" (IASP, 1979)

*** Morfin:**

Morfin hefur áhrif miðtaugakerfið. Verkjustillandi áhrif morfins er tiltölulega skammvinn.

*** Inj. Morfin i.v.**

Verkun nær samstundis sé það gefið i.v. varir 1 til 2 klst
Hæg gjöf í æð: frá 1 mg.
skammtar einstaklingsbundnir.

*** Inj, Morfin SC eða IM**

Verkun hefst innan við 20 min.; varir 3 til 4 klst
Byrjunarskammtar:
Stakur skammtur 3-15 mg.
allt að 6 sinnum á sólarhring.

Verkjastilling í líknandi meðferð

* **T, Contalgin**

Fæst í 6 styrkleikum 50- 200 mg
skammtar: 30-100 mg á 12 klst.
ekki gefið sem p.n. Lyf

* **Tabl.Parkodin Forte**

Verkun innan 30 - 60 min,
verkun varir í 4 - 6 klst
1-2 töflur 1-4 sinnum á dag

Supp Parkodin Forte

* verkun innan 30 - 60 min.

* **T. Voltaren Rapid (prostaglandin hemjari)**

20 til 60 mín.; varir 4 til 6 klst
(ekki mylja)

* **Nobligan**

Er til í töfluformi, supp,
inj, og forðatöflum.
hámarksverkun innan 2 klst
er ekki öndunarbælandi.

* **Durogesic plástur (Fentýl)**

5 styrkleikar frá 12mcg.-100mcg.
er öndunarbælandi.
aðeins notað við mikla verki
ekki hentugur í líknandimeðferð
Skömmtun vandasöm.